

HIV/AIDS entre Mujeres Hispanas/Latinas



Antecedentes

In 2013, an estimated 1,610 diagnoses of HIV infection were among Hispanic/Latina females in the United States and 6 Dependent Areas, including Puerto Rico. The rate of HIV infection among adult and adolescent Hispanic/Latina women was 7.0, more than three times the rate of non-Hispanic white adult and adolescent women.

REALIDADES¹

- En el 2013, mujeres adultas y adolescentes Hispanas/Latinas contaron como el **15% (20, 203,077) de la población femenina de los Estados Unidos y 15% (1,392) de diagnósticos por infección con VIH.**
- El contacto heterosexual represento 86% (1,385) de los diagnósticos de VIH entre las mujeres adultas y adolescentes Hispanas/Latinas, comparado con el 74% (1,168) de las mujeres blancas no-Hispanas y 90% (5,288) de las mujeres Afro-Americanas no-Hispanas en el 2013.
- En el 2013, el uso de drogas inyectables (UDI) fue la segunda y más común forma de transmisión entre mujeres adultas y adolescentes en los Estados Unidos.
 - o **13% (209) de las infecciones por VIH diagnosticadas** entre mujeres Latinas adultas y adolescentes que son Hispanas/Latinas en el 2013 fueron atribuidas a UDI, comparado con el 9% (529) mujeres Afro-Americanas no-Hispanas y con 25% (395) de mujeres blancas no-Hispanas.
- El rango (por cada 100,000) de clasificación de nivel 3/SIDA entre mujeres adultas y adolescentes en los Estados Unidos en el 2013 fue de 4.4 para Hispanas/Latinas, comparado con el 1.1 de mujeres blancas no-Hispanas, y 25.1 de mujeres Afro-Americanas no-Hispanas.
- Entre 1985 y 2013, el porcentaje de nivel 3/SIDA en la clasificación entre mujeres Hispanas/Latinas adultas y adolescentes no cambio de forma considerable, manteniéndose en alrededor del 20%.

Diferencias en relación al lugar geográfico:

- Los rangos de diagnostico por VIH entre mujeres Hispanas/Latinas fue el mayor en el Noreste (39.8), seguido por el Sur (38.9), el Oeste Medio (22.6) y el Oeste (21.8).²
- Los rangos de diagnostico a nivel 3/SIDA en el 2013 entre mujeres Hispanas/Latinas **fue el mayor en el Noreste (11.5)**, seguido por el Sur (5.0), el Oeste Medio (2.5) y el Oeste (1.7).²
- Mujeres adultas y adolescentes en Puerto Rico se encuentran desproporcionadamente impactadas por la epidemia del VIH/SIDA, por ejemplo:
 - o El rango de mujeres adolescentes y adultas viviendo con un diagnostico de infección por VIH hacia finales del 2012 fue de **360.4 en Puerto Rico**, comparado con 169.4 a través de los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes.
 - o El rango de clasificación a nivel 3/SIDA entre mujeres adultas y adolescentes viviendo con VIH en el 2013 fue 6.6 en Puerto Rico, comparado con 4.8 en los Estados Unidos y sus seis áreas dependientes.

Factores de riesgo

- Hispanas/Latinas que carecen de seguro médico o que cuentan con seguro medico limitado enfrentan diferentes barreras en el acceso al cuidado de la salud de calidad, incluyendo la prueba de detección del VIH y/o tratamiento.³
- Los factores de riesgo para las mujeres Hispanas/Latinas (como el uso de condones, la evaluación adecuada de riesgo individual y/o de la pareja, etc.) **puede variar dependiendo del país o territorio de nacimiento**, tiempo de residencia en los Estados Unidos; generación de inmigración y estatus inmigratorio, nivel de educación alcanzado, ingreso medio y edad.⁴⁻⁵
- Para muchas mujeres adultas, incluyendo a las mujeres Hispanas/Latinas, la salud de su familia es la mas alta prioridad que incluso puede tener precedente por arriba de la salud personas debido a tiempo, recursos financieros, y competencia entre las responsabilidades (como el trabajo, la escuela, el cuidado de los hijos, etc.) Esto **podría resultar en que algunas mujeres Latinas/Hispanas no den prioridad al cuidado médico** y/o a la salud reproductiva y sexual (que incluye las pruebas de detección del VIH e ITS) hasta que hay una necesidad importante o una emergencia.⁶

-
- ¹Centers for Disease Control and Prevention. (2015, February). HIV Surveillance Report, 2013; vol. 25. <http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/surveillance/>. Accessed August 27, 2015.
- ²Centers for Disease Control and Prevention. (2015, July 8). HIV among Latinos. Retrieved from <http://www.cdc.gov/hiv/group/raciaethnic/hispaniclatinos/index.html>.
- ³Kates J, Levi J. Insurance coverage and access to HIV testing and treatment: considerations for individuals at risk for infection and for those with undiagnosed infection. *Clinical Infectious Diseases*, 2007. Volume 45; Issue Supplement 4: S255-S260. http://cid.oxfordjournals.org/content/45/Supplement_4/S255.long.
- ⁴Taveras J, Trepka MJ, Khan H, Madhivanan P, Gollub E, Devieux J. HIV risk behaviors among Latina women tested for HIV in Florida by country of birth, 2012. *Journal of Immigrant and Minority Health*. First online: August 7, 2015.
- ⁵Zambrana R, Cornelius L, Boykin SS, Sala Lopez D. Latinas and HIV/AIDS risk factors: implications for harm reduction strategies. *American Journal of Public Health*. 2004 July; 94(7): 1152-1158. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448414/>
- ⁶National Hispanic Caucus of State Legislators. (2006). A Growing Concern: HIV/AIDS and Other STDs. Retrieved from <http://www.nhcsl.org/healthcare/2006-2.html> on August 27, 2015.